

Indices d'un opérateur différentiel matriciel et applications

Kamel BETINA

USTHB, Faculté de Mathématiques, BP 32, El Alia, Bab Ezzouar, Alger

e-mail : kamelbetina@yahoo.fr

Résumé

Dans ce travail, on détermine l'indice formel et l'indice polynômial d'un opérateur différentiel linéaire $P = \sum_{i=0}^m A_i(x) \frac{d^i}{dx^i}$ à coefficients dans $M_n(\mathbb{C}[x])$ avec $\det A_m(x)$ non identiquement nul. Ensuite, on applique ces résultats pour donner une nouvelle démonstration d'un théorème de Bezivin-Robba équivalent au théorème de Lindemann-Wierstrass, ainsi que pour trouver des conditions suffisantes sur l'équation différentielle matricielle de Riccati $Y' = A(x) + B(x)Y + YC(x)Y$ à coefficients dans $M_n(\mathbb{C}[x])$ pour que toute solution méromorphe soit rationnelle et d'autres conditions suffisantes pour que la solution générale soit algébrique.

In this paper, one determines the formal index and the polynômial index of a linear differential operator $P = \sum_{i=0}^m A_i(x) \frac{d^i}{dx^i}$ with coefficients in $M_n(\mathbb{C}[x])$ and $\det A_m(x) \neq 0$.

Then, one applies these results to give a new proof of a Bezivin-Robba theorem equivalent to the Lindemann-Wierstrass theorem, as to find sufficient conditions on the Riccati matrix differential equation $Y' = A(x) + B(x)Y + YC(x)Y$ with coefficients in $M_n(\mathbb{C}[x])$ so that any meromorphic solution is rational and other sufficient conditions so that the general solution is algebraic.

AMS classification subject : 34M, 11J

Key words : opérateurs différentiels, indices, équation différentielle matricielle de Riccati, solutions rationnelles, algébriques, théorème de Lindemann-Weierstrass.

1 Notations

$\mathbb{C}[x]$ = l'anneau des polynômes en x à coefficients dans $\mathbb{C}$,

$\mathbb{C}[x]_a = \left\{ \frac{b}{a^n} ; b \in \mathbb{C}[x], n \in \mathbb{N} \right\}$ = le localisé en $a \in \mathbb{C}[x]$ de l'anneau $\mathbb{C}[x]$,

$\mathbb{C}[[x]]$ = l'anneau des séries formelles en x à coefficients dans $\mathbb{C}$,

$\mathcal{M}(\mathbb{C})$ = le corps des fonctions méromorphes sur $\mathbb{C}$,

Pour $Y = \{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C}$, on pose $\mathcal{M}_Y(\mathbb{C}) = \{f \in \mathcal{M}(\mathbb{C}) ; f \text{ est analytique dans } \mathbb{C} - Y\}$.

Si $g \in \mathbb{C}[x]$, on note $ord_\alpha g$ l'ordre du zéro de g au point α et $d^\circ g$ le degré du polynôme g ; si $A = (a_{ij})$ est une matrice à coefficients dans $\mathbb{C}[x]$, on note $d^\circ A$ le nombre $\sup_{ij} d^\circ a_{ij}$.

Si $u : E \rightarrow E$ est un endomorphisme d'espaces vectoriels, on note $\ker(u, E)$ et $\text{Coker}(u, E)$ respectivement son noyau et son conoyau.

On note $v(f)$ la valuation de $f = \sum_{i \geq i_0} f_i x^i \in \mathbb{C}[[x]][x^{-1}]$:

$$v(f) = \begin{cases} \inf\{i; f_i \neq 0\}, & \text{si } f \neq 0; \\ +\infty & \text{si } f = 0 \end{cases}$$

Si $A = (a_{ij}) \in \text{End}(\mathbb{C}[x]^N)$, on pose $\nu(A) = \inf\{\nu(a_{ij}); 1 \leq i, j \leq N\}$.

On considère l'opérateur différentiel matriciel

$$P = \sum_{i=0}^m A_i(x) \frac{d^i}{dx^i}$$

avec

$$A_i(x) = A_i^0 + A_i^1 x + \dots + A_i^{d_i} x^{d_i} \in M_n(\mathbb{C}[x]^N) \text{ et } \det A_m(x) \neq 0.$$

Si $A_i(x) \equiv 0$, on pose $d_i = -\infty$.

Soient

$$\begin{aligned} n_i &= \inf\{j; A_i^j \neq 0\} = \nu(A_i), \\ n &= \sup_{0 \leq i \leq m} (i - n_i) = \sup_{0 \leq i \leq m} (i - \nu(A_i)), \\ J &= \{j; j - n_j = n\}, \\ L(k) &= \sum_{j \in J} k(k-1)\dots(k-j+1)A_j^{n_j}, \\ l(k) &= \det L(k). \end{aligned}$$

Remarquons que si $m \in J$, alors $l(k)$ est un polynôme en k de degré mN .

Soient

$$\begin{aligned} n' &= \inf_{0 \leq i \leq m} (i - d_i), \\ J' &= \{j; j - d_j = n'\}, \\ D(k) &= \sum_{j \in J'} k(k-1)\dots(k-j+1)A_j^{d_j}, \end{aligned}$$

et

$$d(k) = \det D(k).$$

2 Indice formel et indice polynômial

Définition :

Le polynôme $l(k)$ est appelé polynôme indiciel de l'opérateur matriciel P et l'équation $l(k) = 0$ est appelée l'équation indicielle de l'équation différentielle matricielle $Pu = 0$.

Définition :

Soit $a \in \mathbb{C}$. L'opérateur différentiel matriciel P est dit régulier en a si toute solution de l'équation $Pu = 0$ est analytique, il est dit singulier régulier en a si toute détermination f de toute solution de l'équation $Pu = 0$ est à croissance modérée au voisinage de a i.e si pour tout secteur S de sommet a il existe $\beta \in \mathbb{N}$ tel que $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in S}} (x-a)^\beta f = 0$, P est dit singulier irrégulier en a s'il n'est ni régulier ni singulier régulier en a .

Définition :

Soient E, F deux espaces vectoriels sur un corps K et $u : E \rightarrow F$ un homomorphisme. On dit que l'opérateur u est à indice si $\dim \text{Ker} u$ et $\dim \text{Coker} u$ sont finis et on appelle alors indice de $u : E \rightarrow F$ le nombre entier $\chi(u; E, F) = \dim \text{Ker} u - \dim \text{Coker} u$. Si $E = F$, on note $\chi(u; E)$ l'indice $\chi(u; E, F)$ (s'il existe).

D'après [5], l'opérateur $P : \mathbb{C}^N \{x\}^N \rightarrow \mathbb{C} \{x\}^N$ est à indice et on a :

$$\chi(P; \mathbb{C} \{x\}^N) = mN - \nu(\det A_m) \quad (1)$$

D'après [1], l'opérateur $P : \mathbb{C}[[x]]^N \rightarrow \mathbb{C}[[x]]^N$ est à indice et les quatre conditions suivantes sont équivalentes

- (i) P est singulier régulier en 0 ;
- (ii) $\chi(P, \mathbb{C}[[x]]^N) = \chi(P, \mathbb{C}\{x\}^N)$;
- (iii) l'opérateur

$$P : \frac{\mathbb{C}[[x]]^N}{\mathbb{C}\{x\}^N} \rightarrow \frac{\mathbb{C}[[x]]^N}{\mathbb{C}\{x\}^N}$$

est injectif ;

- (iv) l'opérateur différentiel d'ordre 1 suivant est singulier régulier à l'origine

$$D = \frac{d}{dx} - \begin{pmatrix} 0 & I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & I \\ B_0 & B_1 & B_2 & \cdots & B_{m-1} \end{pmatrix}$$

où $B_i = A_m^{-1} A_i$ ($0 \leq i \leq m-1$) et $I =$ la matrice identité d'ordre N .

Dans la suite, on travaillera au voisinage du point $a = 0$.

Théorème 1 :

- (i) Si $l(k) \neq 0$, alors $\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N) = nN$,
- (ii) Si $m \in J$, alors P est singulier régulier en 0 si, et seulement si, $v(\det(A_m)) = \nu(A_m)N$.

Preuve :

(i) Puisque $\sup_i (i - v(A_i)) = n$, on a :

$$P(f_0 x^k) = L(k) f_0 x^{k-n} + L^1(k) f_0 x^{k-n+1} + \dots$$

$$P(f_1 x^{k+1}) = L(k+1) f_1 x^{k-n+1} + \dots$$

$\vdots$

De là, on déduit par un calcul simple, un isomorphisme

$$P : x^k \mathbb{C}[[x]]^N \xrightarrow{\sim} x^{k-n} \mathbb{C}[[x]]^N$$

et du diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & x^k \mathbb{C}[[x]]^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[[x]]^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[[x]]^N / x^k \mathbb{C}[[x]]^N \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow P & & \downarrow P & & \downarrow P \\ 0 & \longrightarrow & x^{k-n} \mathbb{C}[[x]]^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[[x]]^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[[x]]^N / x^{k-n} \mathbb{C}[[x]]^N \longrightarrow 0 \end{array}$$

on déduit, à l'aide du lemme du serpent, que

$$\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N) = kN - (k-n)N = nN$$

d'où la première partie du théorème.

(ii) Si $m \in J$, $l(k)$ est un polynôme en k de degré $N \sup J = Nn$, donc $l(k) \neq 0$, d'où :

$$\begin{aligned} \chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N) &= nN && \text{(d'après (i))} \\ &= \sup_i \{i - \nu(A_i)\} N \\ &= (m - \nu(A_m))N && \text{(car } m \in J). \end{aligned}$$

Si

$$v(\det A_m) = \nu(A_m)N,$$

alors

$$(m - \nu(A_m))N = mN - v(\det(A_m)),$$

i.e

$$\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N = \chi(P; \mathbb{C}\{x\}^N,$$

c'est à dire que P est singulier régulier en 0.

Réciproquement, si P est singulier régulier en 0, alors :

$$\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N = \chi(P; \mathbb{C}\{x\}^N),$$

mais comme $l(k) \not\equiv 0$, on a :

$$\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N = nN \quad (\text{d'après (i)}),$$

et

$$\chi(P; \mathbb{C}\{x\}^N = mN - v(\det(A_m)) \quad (\text{d'après [5]})$$

donc

$$nN = (m - \nu(A_m))N \quad (\text{car } m \in J),$$

d'où l'égalité

$$v(\det(A_m)) = \nu(A_m)N.$$

Théorème 2 :

1) Si $m \notin J$ et $l(k) \not\equiv 0$, alors P est singulier irrégulier en 0.

2) Si $m \notin J$ et $l(k) \equiv 0$, P peut être singulier régulier ou singulier irrégulier.

Preuve :

1) Si $m \notin J$, alors $m - \nu(A_m) < n$, i.e

$$(m - \nu(A_m))N < nN \quad (2)$$

Si $l(k) \not\equiv 0$, alors $\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N = Nn$ (Théorème 1).

Donc, si $m \notin J$ et $l(k) \not\equiv 0$, on a :

$$\chi(P; \mathbb{C}[[x]]^N - \chi(P; \mathbb{C}\{x\}^N) = Nn - (m - \nu(A_m))N > 0 \quad (\text{d'après (2)})$$

i.e P est singulier irrégulier.

2) En effet :

a) Si

$$P_1 = x^2 I_2 \frac{d}{dx} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{où } I_2 \text{ est la matrice identité d'ordre 2})$$

on a :

$$l(k) \equiv 0,$$

$$m = 1,$$

et

$$n = \sup\{0 - 0, 1 - 2\} = 0,$$

donc $m \notin J$.

Le vecteur $u = \left(0, \sum_{n \geq 0} n! x^{n+1} \right)^t$ vérifie l'équation

$$P_1 u = \begin{pmatrix} 0 \\ -x \end{pmatrix},$$

donc l'opérateur

$$P_1 : \frac{\mathbb{C}[[x]]^N}{\mathbb{C}\{x\}^N} \rightarrow \frac{\mathbb{C}[[x]]^N}{\mathbb{C}\{x\}^N}$$

n'est pas injectif, i.e P_1 est singulier irrégulier en 0.

b) Si

$$P_2 = x^3 I_2 \frac{d}{dx} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

on a :

$$l(k) \equiv 0 ,$$

$$m = 1,$$

et

$$n = \sup\{0 - 0, 1 - 3\} = 0 ,$$

donc $m \notin J$.

Si $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}[[x]]^2$ vérifie l'équation

$$P_2 v = g = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}\{x\}^2 ,$$

alors on a le système différentiel

$$\begin{cases} x^3 v'_1 = g_1 \\ v_1 + x^3 v'_2 = g_2 \end{cases}$$

d'où $v_1, v_2 \in \mathbb{C}\{x\}^2$ et donc l'application

$$P_2 : \frac{\mathbb{C}[[x]]^N}{\mathbb{C}\{x\}^N} \rightarrow \frac{\mathbb{C}[[x]]^N}{\mathbb{C}\{x\}^N}$$

est injective, i.e P_2 est singulier régulier.

Théorème 3 :

Si $l(k) \neq 0$ et $d(k) \neq 0$, alors

$$\chi(P; \mathbb{C}[x]^N) = Nn' = N \inf_i (i - d^\circ A_i).$$

Preuve :

Pour $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\frac{d^i}{dx^i}(x^k) = k(k-1)\dots(k-i+1)x^{k-i}$$

et donc, pour $\lambda \in \mathbb{C}^N$,

$$\begin{aligned} P(\lambda x^k) &= \sum_{i=0}^m A_i \frac{d^i}{dx^i}(\lambda x^k) \\ &= L(k)\lambda x^{k-n} + L_1(k)\lambda x^{k-n+1} + \dots + L_{n-n'-1}(k)\lambda x^{k-n'-1} + D(k)\lambda x^{k-n'} \end{aligned}$$

Ainsi pour un polynôme

$$f = f_0 x^k + \dots + f_l x^{k+l} \in \mathbb{C}[x]^N$$

on obtient

$$\begin{aligned} Pf &= L(k)f_0 x^{k-n} + L_1(k)f_0 x^{k-n+1} + \dots + L_{n-n'-1}(k)f_0 x^{k-n'-1} \\ &\quad + \dots + L(k+l)f_l x^{k-n+l} + \dots + D(k+l)f_l x^{k-n'+l} \end{aligned}$$

Désignons par $M(k)$ l'espace des polynômes de $\mathbb{C}[x]$ de valuation supérieure ou égale à k .

lemme 1 :

Pour k assez grand, on a :

$$\dim \text{Coker}(P : M(k)^N \rightarrow M(k-n)^N) = (n-n')N$$

preuve :

Pour k assez grand, $l(k) = \det L(k)$ et $d(k) = \det D(k)$ ne s'annulent pas.

Si $n = n'$, l'application $P : M(k)^N \rightarrow M(k-n)^N$ est manifestement surjective.

Si $n \neq n'$, soit $\psi_i = (\delta_i^1, \dots, \delta_i^N)^t$ où δ_i^j est le symbole de Kronecker ($1 \leq i \leq N$). Les $(n-n')N$ polynômes $x^{k-n}\psi_i, \dots, x^{k-n'-1}\psi_i$ forment une base d'un espace supplémentaire de $P(M(k)^N)$ dans $M(k-n)^N$. En effet, ils n'appartiennent pas à $P(M(k)^N)$ d'une part, d'autre part, tout $g \in M(k-n)^N$ s'écrit :

$$g = g_0 x^{k-n} + \dots + g_{n-n'+l} x^{k-n'+l}, \quad g_i \in \mathbb{C}^N \quad (0 \leq i \leq n-n'+1)$$

et il existe deux uniques polynômes à coefficients dans $\mathbb{C}^N$
 $f = f_0 x^k + \dots + f_l x^{k+l}$ et $v = v_0 x^{k-n} + \dots + v_{n-n'-1} x^{k-n'-1}$

tels que $Pf = g - v$.

Le polynôme f est déterminé (pour k assez grand) par les $l+1$ équations :

$$\begin{aligned} D(k+l)f_l &= g_{n-n'+l} \\ D(k+l-1)f_{l-1} + L_{n-n'-1}(k+l)f_l &= g_{n-n'+l-1} \\ &\vdots \\ D(k+l-(n-n'+1))f_{l-(n-n'+1)} + \dots + L(k+l)f_l &= g_{l-1} \\ &\vdots \\ L(k+n-n')f_{n-n'} + \dots + D(k)f_0 &= g_{n-n'} \end{aligned}$$

et v par les $(n-n')$ équations

$$\begin{aligned} L(k)f_0 &= g_0 - v_0 \\ L_1(k)f_0 + L(k+1)f_1 &= g_1 - v_1 \\ &\vdots \\ L_{n-n'-1}(k)f_0 + \dots + L(k+n-n'-1)f_{n-n'-1} &= g_{n-n'-1} - v_{n-n'-1} \end{aligned}$$

d'où le lemme 1.

Pour k assez grand, l'application $P : M(k) \rightarrow M(k-n)$ est injective et donc du diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M(k)^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[x]^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[x]^N/M(k) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow P & & \downarrow P & & \downarrow P \\ 0 & \longrightarrow & M(k-n) & \longrightarrow & \mathbb{C}[x]^N & \longrightarrow & \mathbb{C}[x]^N/M(k-n) \longrightarrow 0 \end{array}$$

on déduit que :

$$\chi(P, \mathbb{C}[x]) = \chi(P, M(k), M(k-n)) + kN - (k-n)N = (n'-n)N + nN = n'N.$$

Théorème 4 :

On suppose que $l(k) \neq 0$ et $d(k) \neq 0$. Si $Nn' = mN - d^\circ(\det(A_m(x)))$, alors

$$(Pu \in \mathbb{C}(x)^N, u \in \mathcal{M}(\mathbb{C})^N) \Rightarrow u \in \mathbb{C}(x)^N$$

Preuve :

Il suffit de prouver que l'application

$$P : \frac{\mathcal{M}(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}(x)^N} \rightarrow \frac{\mathcal{M}(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}(x)^N}$$

est injective.

Soit $u \in \mathcal{M}(\mathbb{C})^N$ vérifiant l'équation

$$Pu = g \in \mathbb{C}(x)^N ,$$

g s'écrit sous la forme

$$g = \frac{1}{s}g_1 \quad \text{avec } s \in \mathbb{C}[x] \text{ et } g_1 \in \mathbb{C}[x]^N .$$

En dehors de l'ensemble $Y = \{z \in \mathbb{C}; s(z)\det A_m(z) = 0\}$, le vecteur u est analytique. On a donc

$$u \in \mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N$$

et, en posant $t = t(z) = s(z)\det A_m(z)$, le problème revient donc à montrer le lemme suivant :

lemme 2 :

Sous les hypothèses du Théorème 4, l'application

$$P : \frac{\mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]_t^N} \rightarrow \frac{\mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]_t^N}$$

est injective.

Preuve :

D'après [5], on a :

$$\chi(P; \theta(\mathbb{C})^N) = mN(\dim H^0(\mathbb{C}, \mathbb{C}) - \dim H^1(\mathbb{C}, \mathbb{C})) - \sum_{x \in \mathbb{C}} \text{ord}_x(\det(A_m))$$

or

$$H^0(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \simeq \mathbb{C} ,$$

$$H^1(\mathbb{C}, \mathbb{C}) = 0 ,$$

et

$$\sum_{x \in \mathbb{C}} \text{ord}_x(\det A_m(x)) = d^\circ(\det A_m(x)) ,$$

d'où

$$\chi(P; \theta(\mathbb{C})^N) = mN - d^\circ \det(A_m(x)) .$$

$\mathbb{C}[x]$ étant dense dans $\theta(\mathbb{C})$, donc l'application

$$P : \frac{\theta(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]^N} \rightarrow \frac{\theta(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]^N}$$

est surjective ; si on note A_{x_i} l'espace vectoriel engendré par la famille $\left(\frac{1}{(x - x_i)^j} \right)_{j \geq 1}$, on a :

$$\mathcal{M}_Y(\mathbb{C}) = \theta(\mathbb{C}) \bigoplus_{x_i \in Y} A_{x_i} ,$$

et

$$\mathbb{C}[x]_t = \mathbb{C}[x] \bigoplus_{x_i \in Y} A_{x_i} ,$$

d'où

$$\frac{\mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]_t^N} \simeq \frac{\theta(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]^N} \quad (3) ,$$

par suite

$$\text{Coker} \left(P, \frac{\mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]_t^N} \right) = (0)$$

et donc

$$\begin{aligned}
\dim \ker \left(P, \frac{\mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]_t^N} \right) &= \chi \left(P; \frac{\mathcal{M}_Y(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]_t^N} \right) \\
&= \chi \left(P; \frac{\theta(\mathbb{C})^N}{\mathbb{C}[x]^N} \right) \quad (\text{d'après (3)}) \\
&= \chi(P; \theta(\mathbb{C}^N)) - \chi(P; \mathbb{C}[x]^N) \\
&= mN - d^\circ(\det A_m(x)) - \inf_i (i - d^\circ A_i)N \\
&= mN - d^\circ(\det A_m(x)) - n'N \\
&= 0 \quad (\text{d'après l'hypothèse du Théorème 4})
\end{aligned}$$

d'où le lemme 2.

3 Applications

3.1 Nouvelle démonstration du théorème de Lindemann-Wierstrass

Théorème (Lindemann-Weierstrass) :

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des nombres algébriques deux à deux disjoints et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ des nombres algébriques non tous nuls, alors $\sum_{i=1}^s \lambda_i e^{a_i} \neq 0$.

Dans[4], Bevin et Robba ont démontré que ce dernier résultat est équivalent au théorème suivant :

Théorème 5 :

Soit $L = x^2 \frac{d}{dx} + x - 1$. Si $u \in \mathbb{C}\{x\}$ vérifie $Lu \in \mathbb{C}(x)$, alors $u \in \mathbb{C}(x)$.

Ensuite, ils ont prouvé ce dernier théorème avec des méthodes p -adiques.

Maintenant, on va donner une nouvelle démonstration du Théorème 5 en utilisant le théorème 3 ainsi que la théorie classique des équations différentielles dans le champ complexe.

En posant $P = L$, on a :

$$N = m = 1,$$

$$d(k) = k + 1,$$

$$l(k) \neq 0,$$

$$n' = \inf(0 - 1, 1 - 2) = -1,$$

et

$$d^\circ \det x^2 = 2.$$

Ainsi $d(k) \neq 0$, $l(k) \neq 0$, $Nn' = -1$ et $mN - d^\circ \det x^2 = 1 - 2 = -1$, donc, d'après le Théorème 4, si on montre que $u \in \mathcal{M}(\mathbb{C})$, on pourra conclure que $u \in \mathbb{C}(x)$, ce qui terminera la preuve du Théorème 5.

Le lemme suivant nous permettra donc de conclure.

lemme 3 :

Sous les hypothèses du Théorème 5, on a $u \in \mathcal{M}(\mathbb{C})$.

Preuve :

Soit $g = Lu \in \mathbb{C}(x)$. Puisque $u \in \mathbb{C}\{x\}$, $g \in \mathbb{C}(x)$ et donc $g = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{C}[x]$ et $b(0) \neq 0$.

Soit $Z = \{x \in \mathbb{C}; b(x) = 0\}$. Au voisinage de 0, u est analytique et au voisinage de tout autre point de $\mathbb{C} - (Z \cup \{0\})$, la solution générale de l'équation différentielle

$$Lu = g \quad (F)$$

est analytique. Comme en tout point de Z l'opérateur L est régulier, donc la solution de (F) est à croissance modérée, il nous reste donc à vérifier qu'au voisinage de tout point de Z , la solution générale de (F) est uniforme pour conclure que $u \in \mathcal{M}(\mathbb{C})$.

Au voisinage d'un point $x_0 \in Z$, l'équation (F) se transforme en

$$\frac{du}{dx} + \alpha u = \frac{c}{(x - x_0)^s} = g$$

avec $\alpha, c \in \mathbb{C}\{x - x_0\}$, $s \in \mathbb{N}^*$.

Posons :

$$\begin{aligned} y &= x - x_0, & M &= \frac{d}{dy} + \alpha, \\ u &= u_0 y^k + u_1 y^{k+1} + \dots \quad (k < 0), \\ c &= c_0 + c_1 y + c_2 y^2 + \dots \end{aligned}$$

On a :

$$Mu = g \Leftrightarrow y^s Mu = c,$$

donc

$$\left(c \frac{d}{dy} - c'\right) \left(y^s \frac{du}{dy} + y^s \alpha u\right) = 0 \quad (\text{où } c' = \frac{dc}{dy}).$$

Si on pose

$$P = \left(c \frac{d}{dy} - c'\right) (y^s M) = \left(c \frac{d}{dy} - c'\right) \left(y^s \frac{d}{dy} + y^s \alpha\right),$$

on a

$$\begin{aligned} P(y^k) &= \left(c \frac{d}{dy} - c'\right) (ky^{k+s-1} + \dots) \\ &= c_0 k(k+s-1)y^{k+s-2} - c_1 ky^{k+s-1} \dots \end{aligned}$$

donc les racines du polynôme indicial de P sont $k_1 = 0$ et $k_2 = 1 - s$.

Comme $k_1 - k_2 = s - 1 \in \mathbb{N}$, une base de $\ker P$ est constituée par les solutions

$$w_1 = y^{k_1} \phi_1(y) = \phi_1(y) \quad \text{et} \quad w_2 = aw_1 \log y + y^{k_2} \phi_2(y)$$

où a est une constante complexe, $\phi_1(y)$ et $\phi_2(y) \in \mathbb{C}\{y\}$.

Toute solution u de (F) vérifie l'équation $Pu = 0$, donc u est de la forme

$$\begin{aligned} u &= \gamma w_1(y) + \delta w_2(y) & (\gamma, \delta \in \mathbb{C}) \\ &= \gamma \phi_1(y) + \delta (aw_1 \log y + y^{k_2} \phi_2(y)) \end{aligned}$$

Pour montrer que u est uniforme au voisinage de $y = 0$, il suffit de montrer que $a = 0$.

Supposons que a soit différent de 0. On a :

$$Pu = \left(c \frac{d}{dy} - c'\right) (y^s M)u = 0,$$

donc

$$y^s Mu = \mu c \quad \text{où } \mu \in \mathbb{C},$$

et

$$y^s M(a\phi_1(y) \log y) = \frac{1}{\delta} \left(\mu c - y^s M(\gamma \phi_1(y) + \delta y^{k_2} \phi_2(y)) \right) = h \in \mathbb{C}\{y\}[y^{-1}].$$

Or

$$y^s M(a\phi_1(y) \log y) = y^s \left(a\phi_1'(y) \log y + \frac{a\phi_1(y)}{y} + a\alpha \phi_1(y) \log y \right),$$

d'où

$$\log y = \frac{h - ay^{s-1}\phi_1(y)}{a(\phi_1'(y) + \alpha\phi_1(y))} \in \mathbb{C}\{y\}[y^{-1}] \quad (\text{contradiction}),$$

et donc, nécessairement, $a = 0$.

3.2 Equation différentielle matricielle de Riccati

On considère l'équation différentielle matricielle de Riccati :

$$Y'(x) = A(x) + B(x)Y(x) + Y(x)C(x)Y(x) \quad (R_1)$$

où $A(x), B(x), C(x) \in M_n(\mathbb{C}[x]^N)$, $\det C(x) \neq 0$, et $Y(x)$ est la matrice inconnue.
Le changement de fonction inconnue

$$Y(x) = -C(x)^{-1}W'(x)W(x)^{-1}$$

nous donne l'équation différentielle linéaire matricielle

$$W''(x) - \{C(x)B(x)C(x)^{-1} + C'(x)C(x)^{-1}\}W'(x) + C(x)A(x)W(x) = 0 \quad (R_2)$$

Si on pose $C^{-1}(x) = \frac{1}{\det C(x)}C_0(x)$ et $\det C(x) = c_1(x) \in \mathbb{C}[x]$, alors l'équation (R_2) se transforme en

$$A_2(x)W'' + A_1(x)W' + A_0(x)W = 0 \quad (R_3)$$

où

$$\begin{aligned} A_2(x) &= c_1(x)I_N, \\ A_1(x) &= -\{C(x)B(x)C_0(x) + C'(x)C_0(x)\}, \end{aligned}$$

et

$$A_0(x) = c_1(x)C(x)A(x).$$

On remarquera que les points singuliers de (R_1) (i.e les points où la solution générale de (R_1) n'est pas holomorphe) sont les points de l'ensemble $Z = \{x \in \mathbb{C}; c_1(x) = 0\}$.

Théorème 6 :

1) Si $2 - v(c_1(x)) \geq \sup(1 - \nu(A_1(x)), -\nu(A_0(x)))$, alors toute série formelle

$Y = \sum_{n \geq 0} Y_n x^n$ solution de l'équation (R_1) est convergente.

2) Si en tout point $z \in Z$, l'opérateur P est singulier régulier, alors toute solution uniforme de (R_1) est méromorphe.

Preuve :

1) En considérant l'opérateur différentiel

$$P = A_2(x)\frac{d^2}{dx^2} + A_1(x)\frac{d}{dx} + A_0(x) \quad ,$$

on obtient :

$m = 2 \in J$, puisque $2 - v(c_1(x)) \geq \sup(1 - \nu(A_1(x)), -\nu(A_0(x)))$.

Mais comme

$v(\det(A_2(x))) = v(\det(c_1(x)I_N)) = v(c_1^N(x)) = Nv(c_1(x)) = Nv(c_1(x)I_N) = Nv(A_2(x))$,

on déduit que l'opérateur P est singulier régulier (Théorème 1), donc toute solution série formelle de l'équation $Pu = 0$ est convergente.

Or W vérifie aussi l'équation différentielle

$$W' = DW \quad \text{avec } D = -CY = D_0 + D_1x + D_2x^2 + \dots \in \text{End}(\mathbb{C}[[x]]^n),$$

donc en posant $W = W_0 + W_1x + W_2x^2 + \dots$, on obtient par identification les relations

$$\begin{aligned} W_1 &= D_0W_0, \\ 2W_2 &= D_0W_1 + D_1W_0 \\ &\vdots \\ nW_n &= H_n(W_0, \dots, W_{n-1}, D_0, \dots, D_{n-1}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

où H_n est un polynôme à $2n$ variables.

Ces relations nous permettent, en choisissant arbitrairement W_0 , de calculer de proche en proche W_1, W_2 etc ..., ce qui signifie que W est une série formelle solution de l'équation $Pu = 0$, donc W est convergente, par suite la série formelle $Y = -C^{-1}(x)W'W^{-1}$, qui est solution de l'équation (R_1) , est convergente.

2) On suppose que P est singulier régulier en tout point $z \in Z$, et soit Y une solution uniforme de l'équation (R_1) . En posant $Y = -C^{-1}(x)W'W^{-1}$, W est une solution de l'équation (R_2) , donc W est à croissance modérée au voisinage de chaque point singulier, par conséquent Y est méromorphe, d'où la deuxième partie du Théorème 6.

Théorème 7 :

On considère le polynôme $d(k)$ associé à l'opérateur différentiel P . On suppose que :

- 1) $d(k) \not\equiv 0$,
- 2) $2 - d^\circ c_1(x) \leq \inf(1 - d^\circ A_1(x), -d^\circ A_0(x))$,
- 3) en tout point singulier $z \in Z$, les racines du polynôme caractéristique de P sont entières, distinctes et que si une racine r' est égale à $r - d$, où r est une autre racine et d est un entier > 0 , le calcul des coefficients de la solution (de l'équation $Pu = 0$)

$$x^{r'} + g_{r'+1}x^{r'+1} + \dots + g_r x^r + \dots$$

est possible jusqu'à g_r .

Alors toute solution de l'équation (R_1) est rationnelle.

Preuve :

En écrivant explicitement les coefficients de l'opérateur différentiel

$$P = A_2(x)\frac{d^2}{dx^2} + A_1(x)\frac{d}{dx} + A_0(x) \quad ,$$

on a :

$$A_2(x) = c_1(x)I_N = c_1^{n_2}I_N x^{n_2} + \dots \quad (\text{avec } c_1^{n_2} \neq 0),$$

$$A_i(x) = A_i^{n_i} x^{n_i} + \dots \quad (i = 0, 1),$$

d'où

$$L(k) = k(k-1)c_1^{n_2}I_N + \text{termes en } k \text{ de degré } > 2,$$

donc le polynôme

$$l(k) = \det L(k) = k^{2N}(c_1^{n_2})^2 + \text{termes en } k \text{ de degré } > 2$$

n'est pas identiquement nul.

D'autre part, $d(k) \not\equiv 0$ par hypothèse et la relation

$$2 - d^\circ c_1(x) \leq \inf(1 - d^\circ A_1(x), -d^\circ A_0(x))$$

signifie que

$$(2 - d^\circ c_1(x))N = \inf(2 - d^\circ A_2(x), 1 - d^\circ A_1(x), -d^\circ A_0(x))N = n'N,$$

donc, d'après le Théorème 4, toute solution méromorphe W de l'équation $Pu = 0$ est rationnelle. Or la condition 3) du théorème implique que toute solution de (R_3) est méromorphe, donc rationnelle, et par suite toute solution $Y = -C^{-1}W'W^{-1}$ de l'équation (R_1) est rationnelle, d'où le Théorème 7.

Théorème 8 :

Si en tout point singulier $z \in Z$, l'opérateur P est singulier régulier et les racines $k_1, \dots, k_{2N}$ de son polynôme caractéristique $l(k)$ sont rationnelles et vérifient $k_i - k_j \notin \mathbb{Z}$ pour $i \neq j$, alors toute solution de l'équation (R_1) est algébrique.

Preuve :

On cherche une base de solutions de l'équation (R_3) au voisinage de $x = a \in Z$ sous la forme de séries formelles

$$W = x^k \sum_{n \geq 0} W_n y^n,$$

avec $y = x - a$.

Elles doivent vérifier l'équation

$$\begin{aligned} 0 = Pu = \sum_{n \geq 0} P(W_n y^{k+n}) &= L(k)W_0 y^{k-n} + F_1(k)W_0 y^{k-n+1} + F_2(k)W_0 y^{k-n+2} + \dots \\ &+ L(k+1)W_1 y^{k-n+1} + F_1(k+1)W_1 y^{k-n+2} + \dots \end{aligned}$$

avec $F_i(k) \in \mathbb{C}[k]$ ($i = 0, 1, 2, \dots$).

Si k_i est une racine du polynôme $l(k)$, par hypothèse $l(k_i + j) \neq 0$ pour $j \in \mathbb{N}$, et donc on peut déterminer de manière unique tous les coefficients W_n par récurrence et ainsi on obtient une solution $W(k_i)$. Cette solution $W(k_i)$ est convergente (Théorème 6) et les $W(k_i)$ ($1 \leq i \leq 2N$) forment une base de l'espace vectoriel des solutions de l'équation $Pu = 0$ au voisinage du point a , donc la solution générale $Y = -C^{-1}(x)W'W^{-1}$ de (R_1) est algébrique, i.e les coefficients de cette matrice sont algébriques sur $\mathbb{C}(x)$. Ceci termine la preuve du théorème.

BIBLIOGRAPHIE :

- [1] K. Betina, *Sur l'indice des opérateurs différentiels ordinaires*, Lecture Notes in Math., n° 1075, p.1-48 Springer-Verlag.
- [2] K. Betina, *Indices polynômiaux et solutions polynômiales de certains systèmes de Pfaff singuliers*, Analysis 12 , 195-216.
- [3] K. Betina, *Sur l'équation de Riccati*, Analysis 19, 29-50.
- [4] J.P. Bezivin, P. Robba, *A new p-adic method for proving irrationality and transcendence results*, Annals of Maths, 129 (1989), 151-160
- [5] H. Komatsu, *On the index of differential operators*, Journal. Fac Sci. Tokyo, IA (1971), 379-398.
- [6] B. Malgrange, *Sur les points singuliers des équations différentielles*, L'enseignement Mathématique, t. XX (1974), 1-2.